

# ¿Qué Servicios y Vacunas Necesita Mi Perro?

## Paquetes:

Solo Rabia      Perro Familiar Básico      Perro Social / Acicalarse

	Descripción	Recomendado Por	Frecuencia: Adultos	Frecuencia: Perritos	Solo Rabia	Perro Familiar Básico	Perro Social / Acicalarse
<b>Visita de Oficina \$15</b>	Se requiere para todas las mascotas que reciben atención preventiva. Le informaremos sobre las preocupaciones que puedan necesitar un veterinario de servicio completo. Con prueba de asistencia del gobierno, le tarida no se aplicará.	Todos los perros	Anualmente	Cada 3-4 semanas a medida que crecen y antes de su cirugía de esterilización / castración.	✓	✓	✓
<b>Vacuna Contra la Rabia</b> Un Año: \$15 Tres Años: \$30	Requerido por ley para todas las mascotas. Protege a su perro contra la rabia, una enfermedad que generalmente se transmite a través de la saliva o heridas por mordeduras de otros animales que también es mortal para los humanos.	Todos los perros	+ Primera vez: Un año + Puede durar hasta tres años con prueba de una vacuna previa.	Dar entre 12 y 16 semanas de edad; dura 1 año	✓	✓	✓
<b>Vacuna DAPP-L</b> (Distemper, Adenovirus, Parainfluenza, Parvovirus, Leptospirosis) \$15	Protege contra algunas de las enfermedades más comunes (y mortales). Estas enfermedades pueden durar largos períodos de tiempo en el medio ambiente. Por lo tanto, incluso si su perro / cachorro no viajará mucho fuera de su hogar o patio, es importante tenerlo.	Todos los perros	+ Primera vez: Refuerzo dentro de tres a cuatro semanas + Anualmente	Comience a las 8 semanas y refuerce cada 3-4 semanas según lo recomendado por su veterinario.	✗	✓	✓
<b>Vacuna Bordetella \$15</b>	Ayuda a proteger a su mascota contra la "tos de la perrera", un virus contagioso que puede causar que su mascota contraiga una infección grave de las vías respiratorias superiores. Su perro puede infectarse a través del contacto de nariz a nariz, ladrando, estornudando o tosiendo cerca de otros perros.	Perros que visitan parques, saludan a otros perros en caminatas, se alojan en un internado o ven a un peluquero	+ Bueno: Anualmente + El mejor: Cada seis meses	Dar una vez entre 10-12 semanas de edad. Dura de 6 meses a 1 año dependiendo de la exposición a otros perros.	✗	✓	✓
<b>Vacuna CIV</b> (Virus de la gripe canina) \$25	Protege contra la CIV: una enfermedad altamente contagiosa que causa que el 80% de las mascotas infectadas experimenten síntomas o infecciones de las vías respiratorias superiores. El 20% que no tiene síntomas aún puede transmitir el virus. El virus se transmite a través del contacto de nariz a nariz, ladrando, estornudando y tosiendo.	Perros que visitan parques, saludan a otros perros en caminatas, se alojan en un internado, ven a un peluquero o viajan	+ Primera vez: Refuerzo dentro de tres a cuatro semanas + Anualmente	Comience entre 10-12 semanas, refuerzo en 2-3 semanas. Tiene una duración de 1 año.	✗	✗	✓
<b>Prueba Fecal \$22</b>	Pruebas de huevos de parásitos en las heces de su mascota. Evalúe si se necesita desparasitante adicional y si los gusanos se pueden transmitir a las personas en su hogar.	Todos los perros. Los perros que van a parques para perros o visitan instalaciones de alojamiento / aseo tienen un mayor riesgo.	Anualmente	Comience a las 10-12 semanas, pruebe nuevamente después del tratamiento si se encuentran parásitos.	✗	✗	✓
<b>Prueba de Gusano del Corazón \$20</b>	Prueba para gusanos del corazón adultos. Los gusanos del corazón son transmitidos por mosquitos, ¡y tenemos muchos en Tennessee! Se recomienda realizar pruebas incluso si su mascota está en prevención. La enfermedad del gusano del corazón es mortal si no se trata.	Todos los perros	Anualmente (incluso si su perro está en prevención regular)	No es necesario hasta que tengan 1 año. Los cachorros deben comenzar la prevención mensual del gusano del corazón a las 8 semanas de edad.	✗	✗	✓
<b>Desparasitante \$5 -10</b>	Para gusanos redondos y anquilostomas. Especialmente recomendado para perros que salen al aire libre y pueden cazar vida silvestre, lo que expone a su perro a un mayor riesgo de infección por parásitos. Estos gusanos también se pueden transmitir a los humanos.	Todos los perros	Anualmente	Comience a las 6-8 semanas, tratamiento adicional según lo recomendado por un veterinario.	✗	✗	✓